

1° CONGRESO ARGENTINO DE  
MEDICINA INTERNA  
PEDIÀTRICA  
2,3 y 4 de noviembre de 2016

---


**Mortalidad Infantil**  
**Síndrome de Muerte Súbita del Lactante**

Dra. Virginia Orazi  
Área Salud Integral del Niño  
Dirección Nacional de Salud Materno, Infantil  
y adolescencia



Ministerio de Salud  
Presidencia de la Nación

# Defunciones Postneonatales domiciliarias



# Grupo de Trabajo en Muerte Súbita e Inesperada del lactante – SAP-

## Publico Consideraciones sobre sueño seguro

- Para todo el equipo de salud
- Hablamos de Muerte Súbita e Inesperada
- Para tomar todas las causas
- **Análisis y desarrollo:** Embarazo-posición para dormir – tabaco-ropa de cama-colecho-lactancia-chupete.


Concluyo **RECOMENDACIONES DE SUEÑO SEGURO**



Ministerio de Salud  
Presidencia de la Nación

# Muerte Súbita e Inesperada del Lactante (MSIL)

Describe la muerte repentina de un niño menor de un año, sin causa evidente, antes de la investigación médica y legal.



# Síndrome de Muerte súbita del Lactante (SMSL)

Define la muerte de un niño menor de 1 año que ocurre, aparentemente, durante el sueño y no puede ser explicada luego de una investigación exhaustiva, que incluye:

- una autopsia completa
- la investigación de las circunstancias de la muerte
- la revisión de la historia clínica


**Preocupación de salud pública**

**Causas desconocidas**



Ministerio de Salud  
Presidencia de la Nación

# Evolución de las defunciones de niños menores de 1 año por SMSL en Argentina. Números absolutos



# Defunciones de menores de 1 año por Síndrome de Muerte Súbita del lactante

últimos años - Total país - Fuente DEIS Msal

Año	Total	Neonatal precoz	Neonatal tardía	Post-Neonatal
2014	202	22	37	143
2013	275	22	32	221
2012	274	16	34	224
2011	271	15	45	211
2010	281	25	37	219



# HIPÓTESIS DEL TRIPLE RIESGO


**Lactante vulnerable**  
Varón  
Prematuro.  
Exposición prenatal al tabaco y alcohol.  
Alteración sistema serotoninérgico.  
Canalopatías.  
Polimorfismos y mutaciones.



**Período crítico vulnerable**  
Niño < de 1 año.  
Pico etario: 2-4 meses.

**Factores de riesgo extrínseco**  
Dormir boca abajo/de costado.  
Colecho.  
Colchón blando.  
Cabeza cubierta.  
Sobrecalentamiento.  
Tabaquismo ambiental

# Posición para dormir





Normal



Plagiocefalia



Braquicefalia

NO





# Mensajes



MENTORING 1-1  
Fotografía Newborn

*Paulo Peralta*  
Fotografía



Clase intensiva personalizada de un día para aprender todo sobre fotografía de recién nacidos. **Contactame!**



Leandro  
36 años - Devoto

Denise  
32 años - Barrio Norte


NUESTROS CLIENTES. NUESTROS PROTAGONISTAS. **arredo**

# Mensajes



inis  
re.

# Resultados Encuesta nacional posición para dormir observada en las maternidades –total País




Fuente: Encuestas Nacionales de Muerte Súbita. DINAMI. Año 2010



Ministerio de Salud  
Presidencia de la Nación

## Encuesta nacional - Posición recomendada a la madre para dormir al RN al alta de la maternidad - 2010 - Total País-



**Trabajo de investigación –Htal B. Houssay  
Residentes de Pediatría 2014 - 2015  
- Pcia. Bs. As – Pdo. Vte. Lòpez -**

**Cumplimiento de las recomendaciones de sueño  
seguro y su indicación al alta de la maternidad y  
en los controles de salud**

Residentes de partido – 133 encuestas a madres

Hospital –CAPS- Vacunatorio


Población 35% NBI – 48% secundario incompleto –

65% madres no trabajan – 93% 5 controles en el embarazo




# ¿Como durmió el bebes la noche anterior ?

## Posición al dormir



## Lugar donde durmió



Cohabitación 95%

Uso chupete 29%


No se fumo en el hogar 91%




Ministerio de Salud  
Presidencia de la Nación

# Recomendaciones sobre Sueño Seguro a las madres

## Posición para dormir



## Lugar donde dormir



Cohabitación 40%

Lactancia 80%

No fumar en el hogar 65%



## Recomendaciones para un sueño seguro durante el primer año de vida

- Dormir boca arriba.
- El colchón firme y del mismo tamaño de la cuna.
- Compartir la habitación de los padres, pero no la cama.
- No colocar ningún tipo de objeto dentro de la cuna.
- La cuna clásica de madera con barrotes es la mejor opción.
- Tapar al niño hasta las axilas, los brazos por fuera de la ropa de cama y sujetar con firmeza la ropa de cama.
- Evitar el exceso de abrigo.
- Temperatura ambiente moderada.
- Ofrecer el chupete para dormir, con lactancia establecida.
- Realizar los controles periódicos durante el embarazo.
- No fumar durante el embarazo.
- No exponer al niño al humo del tabaco.
- Promover la lactancia materna.
- Utilizar la silla de seguridad para auto (huevito) exclusivamente para viajar en un vehículo.
- Vacunación completa.





# Gracias

[viorazi@dinami.gov.ar](mailto:viorazi@dinami.gov.ar)



Ministerio de Salud  
Presidencia de la Nación