

Sociedad Argentina de pediatría

3° CONGRESO ARGENTINO DE MEDICINA INTERNA PEDIÁTRICA

Disertantes:

Enf. Silvana Agostini

Enf. Miguel Valdez



Hospital de Pediatría S.A.M.I.C.
"Prof. Dr. Juan P. Garrahan"

ENTRENAMIENTO A LA FAMILIA EN LA COLOCACIÓN DE SNG



La alimentación para tu hijo e fundamental, prepárate para ayudarlo

DEFINICIÓN


- El procedimiento consiste en la introducción de un tubo desde la nariz (o boca) al estómago.
- La sonda nasogástrica o también llamada sonda gastronasal puede ser de polivinilo (mas rígidas), siliconadas o de poliuretano, elegidas a la hora de larga duración.

Enfermería

- Presentarse con los padres.
- Lavado de manos.
- Colocar pulsera identificación
- Explicar procedimiento.
- Brindar contención y seguridad.
- En la citación pedir que sean dos operadores.
- Corroborar indicación médica
- Control del estado de conciencia, signos vitales y antropometría.
- Examen físico.
- Estado de hidratación, mucosas y piel de la cara del niño.
- Horario de última ingesta de alimentación.
- Registrar todo en la hoja de enfermería.
- Preparación de fórmula indicada.
- Preparación del equipo.
- Entrenamiento a los padres.
- Corroboración de las habilidades y destrezas de los padres.
- Citar a los padres para control y reevaluación periódicamente.

Lavado de manos

- Es la herramienta básica para la prevención de complicaciones.



¿POR QUÉ NOS LAVAMOS LAS MANOS?



OBJETIVOS

- Lograr el óptimo estado nutricional de los pacientes con múltiples patologías que afecten a la ingesta vía oral para satisfacer las necesidades nutricionales totales o complementarias diarias.
- Lograr que los padres, familiares tutores o encargados de los niños con alteración de su estado nutricional logren realizar el procedimiento de manera correcta.
- Disminuir la ansiedad de los padres o familiares.
- Lograr la concurrencia de la familia del niño a los turnos y horarios previamente planificados y acordados con Enfermería, para la sesión de Hospital de día polivalente (tres días consecutivos).
- Incorporar habilidades y destreza para: preparación de materiales, colocación, medición, verificación, fijación y cuidados de la SNG.
- Preparación de las fórmulas.
- Planificación de horarios del pasaje de la alimentación y administración de medicación.
- Lograr que puedan identificar complicaciones y signos de alarma con rapidez.
- Incorporen la importancia del cuidado de la integridad cutánea.
- Apliquen las recomendaciones para prevención de infecciones en el transcurso del tratamiento.
- Poder reevaluar a las familias entrenadas cada vez que concurren a citas al sector y reforzar las habilidades y destrezas adquiridas.

EQUIPO


Sobre una superficie limpia preparar:

- Manoplas
- Estetoscopio
- Sondas nasogástricas de diferentes medidas según edad y tamaño del paciente e indicación médica .Polivinilo (PVC). Neonatos: K35, K33; lactantes y niños mayores: K31, K30.
- Sondas de Silicona (silastic) de 6, 7 y 9 French.
- Tijera
- Riñonera
- Jeringas de 2.5, 5, 10, 20 y 60 ml.
- Tela adhesiva común y/o hipoadérgica
- Parche hidrocoloide (Duoderm)
- Jabón neutro
- Gasas
- Alcohol al 70%
- Vaso con agua
- Toallas de papel
- Bajalengua
- Linterna
- Ampollas de agua destilada
- Sabana enrollada
- Biberón con fórmula indicada
- Medicación (si tiene indicada)


Iniciar la colocación de la Sonda Nasogástrica

Medición:

- Colocar al niño a 180° o Decúbito dorsal




- Llevar la sonda desde la punta de la nariz hacia el lóbulo de la oreja.
- Luego sin soltar de allí hacia el apéndice xifoides (desde donde termina el esternón).
- A los padre les explicamos desde la ultima costilla un dedo más abajo.



Posición de colocación

- El niño debe estar en posición semisentado o a 45° (Posición de Fowler)

- Colocar la sonda (sin forzar) hasta la marca realiza en el paso anterior



Fijación y Verificación

- Fijar la SNG con tela adhesiva, sobre la piel limpia, seca y sana.



- **SIEMPRE** inyectar un push de aire con la jeringa y escuchar el sonido que llega al estómago del niño por la sonda



CORROBORACIÓN: Los padres deben tomar conciencia de la importancia de realizar este paso cada vez que van a utilizar la SNG, esto previene complicaciones.

Pasaje de la Alimentación


- La formula debe pasar por gravedad, ni muy rápido ni muy lento, como si se alimentara por biberón.



- El alimento debe tener la temperatura adecuada (corroborar colocando unas gotas en nuestro antebrazo)



- Luego de su uso la SNG siempre debe ser lavada con agua potable.



Cuidados


Control de la coloración de la piel y narinas.



Higiene bucal y control de las mucosas en busca de complicaciones



La sonda siempre debe estar limpia y cerrada



SIGNOS DE ALARMA



Debe concurrir al medico en casos de:

- Dolor abdominal
- Abundante tos
- Fiebre
- Diarrea
- Constipación
- Ahogos
- Distensión abdominal
- Dificultad en la colocación de la SNG
- Irritabilidad
- Lesiones en la piel o mucosas



Con amor, dedicación y
compromiso todo es
posible



¡Muchas gracias!