

Hepatitis Virales: Nuevos escenarios

6° Congreso Argentino de Hepatología – SAP 2017

- ***HAV:*** dosis única 2005-2011, cobertura 92%. En una muestra de 1088 niños de 7,7 años (6,3-9,2 a) el anti HAV IgG fue positivo en el 97,4%. *Ped Infect Dis J, 2016*
- ***HEV:*** 20 millones de infecciones agudas/año/mundo, siendo 3,3 millones, los sintomáticos (E1, E2). Infección crónica en inmunosuprimidos. En Argentina, E3 responsable de FHF en 3 niños. *Acta Gastroenterol Latinoam, 2006*

Hepatitis Virales: Nuevos escenarios

6° Congreso Argentino de Hepatología – SAP 2017

Región de las Américas, OPS '16

- ***HBV***: 2,8 millones de personas con infección crónica

Prevalencia del HBsAg: 0,28% ('16), 0,81% ('65-'13)

Importancia de la vacunación: 69% países 1° dosis al nacer

56% de los casos nuevos son por Transmisión Perinatal

- ***HCV***: 7,2 millones de personas con infección crónica

Prevalencia del anti- HCV: 0,73%. Genotipo: 1 a, 1 b: 70%

Solo el 25% han sido diagnosticados, y el 16% de éstos recibieron tratamiento