


Encuesta Nacional de Salud Sexual y Reproductiva revela elevado uso de anticonceptivos en adolescentes


Ministerio de Salud, presentación mayo 2014




- 
- ◆ La encuesta, del tipo probabilístico, abarcó a los varones de 14 a 59 años y las mujeres de 14 a 49 años residentes en centros urbanos de 2.000 o más habitantes.
 - ◆ Bajo estos parámetros, el trabajo involucró a 6.000 hogares representativos de 20 millones de habitantes, que es la población en edad reproductiva.

En cuanto a la edad de iniciación sexual


- ◆ las mujeres comienzan un poco más tarde que los varones. Entre las mujeres la edad promedio de la primera relación es de 17,3 años.
- ◆ En tanto para los varones la edad promedio de inicio es de 16 años.

- 
- ◆ Tanto hombres como mujeres tienen un alto conocimiento sobre los métodos anticonceptivos aunque difieren en el método mencionado.
 - ◆ El 94% de las mujeres entrevistadas mencionó a las pastillas anticonceptivas en primer término, seguido por el preservativo o condón con un 87% y un 62% al DIU.
 - ◆ Mientras que entre los varones, el método más nombrado es el preservativo, con un 95%; luego las pastillas anticonceptivas en un 82%, y un 37% mencionaron al DIU.

- 
- ◆ Un dato interesante que revela la encuesta es que casi siete de cada diez de las mujeres y los varones entrevistados usaron algún método anticonceptivo en su primera relación sexual, siendo el preservativo el método más utilizado en esta instancia.
 - ◆ Por grupo de edad se ven diferencias muy significativas: mientras que el 90% de las mujeres de 14 a 19 años utilizó algún anticonceptivo en su primera relación sexual, el porcentaje se reduce al 49% en el caso de las de 40 a 49 años.

El embarazo adolescente en Argentina

- ◆ **Fondo Población Naciones Unidas**
- ◆ **<https://www.youtube.com/watch?v=Cii2bNlgS3U>**



- ◆ **REPITENCIA DEL EMBARAZO EN LA ADOLESCENCIA**


- ◆ 7 millones de adolescentes (10 - 19 años). 17% de población total.

- ◆ • **11%** de los nacimientos de madres de 15 a 17 años son de orden 2 o más (*DEIS, 2010*)

- ◆ **POBLACIÓN TOTAL DE ADOLESCENTES EN EL PAÍS**

- ◆ • **25%** de los nacimientos de madres de 18 a 19 años son de orden 2 ó más (*DEIS, 2010*)

- ◆ Cantidad de nacimientos de mujeres entre 10 y 14 años, expresados cada 1.000 mujeres de esa misma edad(*DEIS, 2010*)



- ◆ **TASA DE FECUNDIDAD DE 10 A 14 AÑOS (2010)**

- ◆ • Aprox. 23000 nacimientos son segundo o mayor orden de madres adolescentes (*Binstock y Gogna, 2013*).

- ◆ 1,9 x 1000 → 3117 nacimientos

- ◆ • Más de un 25% de madres adolescentes encuestadas se embarazó por segunda vez dentro del primer año de haber tenido su primer hij@. (*Binstock y Gogna, 2013*).

- ◆ Cantidad de nacimientos de mujeres entre 15 y 19 años, expresados cada 1.000 mujeres de esa misma edad (DEIS, 2010)

- ◆ **TASA DE FECUNDIDAD DE 15 A 19 AÑOS (2010)**


- ◆ 67 x 1000 → 114.474 nacimientos


ADOLESCENCIA, MORTALIDAD MATERNA Y ABORTO

- Hay 322 nacimientos por día de madres adolescentes
- En Argentina, el embarazo adolescente representa el 15% del total de nacimientos
- La maternidad en la adolescencia es más frecuente entre las jóvenes de sectores pobres y las que tienen menor nivel educativo (*Binstock y Gogna, 2013*)
- **16,9** de los egresos por aborto corresponden a adolescentes. Argentina 1995-2009 (* no especifica el rango etario)

Embarazo no buscado

- **65,5%** no utilizaba un método anticonceptivo al momento del embarazo (*SIP, 2010*).
- La proporción de madres entre las adolescentes con menor nivel educativo (primario completo o menos) al menos triplica a la que se observa en las adolescentes con secundaria incompleta y más, pese a que éstas últimas tienen en promedio mayor edad y por lo tanto mayor tiempo de exposición al riesgo de ser madres (*Binstock y Pantelides, 2005*).

- 
- **20%** de madres adolescentes encuestadas consideró interrumpir su embarazo al momento de conocer su primer embarazo (*Binstock y Gogna, 2013*)
 - **69%** de madres adolescentes no planearon ese embarazo (*SIP, 2010*).
 - **40,4%** de madres adolescentes encuestadas no deseaba/planeó el embarazo (*Binstock y Gogna, 2013*)


- 
- **14%** de madres adolescentes encuestadas consideró interrumpir su embarazo al momento de conocer su segundo embarazo (*Binstock y Gogna, 2013*)
 - **20,3%** de madres adolescentes encuestadas “hubiese preferido esperar” a tener su primer hij@ en aquel momento (*Binstock y Gogna, 2013*)
 - Uso de MAC –quienes no buscaban el primer embarazo-entre adolescentes encuestadas: casi nunca 36%, a veces 46%, siempre 18% (preservativo 72%) (*Binstock y Gogna, 2013*)
 - Mitad de las madres adolescentes ya había abandonado la escuela al momento de quedar embarazada (*Gogna et al, 2005; Binstock y Gogna, 2013*)

Uso de metodos anticonceptivos (MAC)

- **3** Total muertes maternas adolescentes por aborto. Argentina 2000-2010 (*DEIS, 2010*)
- **80%** de las adolescentes que no tienen hij@s asiste a la escuela, mientras que entre las adolescentes madres esa proporción es de **25%** (*Censo 2001 cit. PNSIA, 2012*).
- **43** total muertes maternas adolescentes. Argentina 2000-2010 (*DEIS, 2010*)
- Uso de MAC –quienes no buscaban el segundo embarazo-entre adolescentes encuestadas: casi nunca 37%, a veces 44%, siempre 18% (píldora 40% y preservativo 40%) (*Binstock y Gogna, 2013*)
- De las que adolescentes que estaban estudiando al momento de quedar embarazadas sólo 4 de cada 10 continuaron escolarizadas hasta el séptimo mes (*Gogna et al, 2005*)

Uso de metodos anticonceptivos (MAC)

- **73%** llevaba saliendo con el padre de su hijo entre 1 mes y 12 meses cuando se embarazó (*Binstock y Gogna, 2013*).
- El **40%** de las adolescentes embarazadas encuestadas era su primera pareja sexual (*Binstock y Gogna, 2013*).
- 1 Mujeres adolescentes encuestadas 18 y 24 años (n=1571).



💧 https://www.youtube.com/watch?v=_ahZpZU3TOk