


ENURESIS








Enuresis




- *Definición*


Se denomina enuresis a la pérdida involuntaria de orina que se presenta generalmente de noche en los niños mayores de 5 - 6 años.








Enuresis no es lo mismo que incontinencia

- *Incontinencia es la incapacidad de estar seco entre 2 micciones. Es un síntoma de distintas causas como alteraciones anatómicas y funcionales de la vía urinaria.*
- 
- 
- 



¿Cuándo los niños están maduros para controlar la micción?


- *La mayor parte de los niños no controlan sus esfínteres hasta los 2 a 4 años de edad*
Controlan primero durante el día y luego de noche.
El control completo de su vejiga es variable.
No mojarse en la cama es la última etapa del aprendizaje
- 
- 
- 





Tipos de enuresis

- Enuresis primaria si nunca logró de orinarse en la cama de noche durante 6 meses consecutivos
- Enuresis secundaria es cuando luego de 6 meses de "cama seca" comienzan a mojarla de noche.








La enuresis puede desaparecer sin tratamiento?

- *El 15% aproximadamente de la población infantil mayor de 5-6 años tiene enuresis primaria. La resolución de este síntoma es alta alrededor del 10% al 15% de estos niños por año resuelven el problema.*
- 
- 





Hay casos familiares de enuresis?

- *La incidencia familiar es alta. Un 44% tienen un padre que fue enurético en la niñez y si ambos padres lo fueron el niño tiene hasta un 77% de probabilidades de tener enuresis.*
- 
- 
- 




Hay que esperar que desaparezca por sí sola?

- *Luego de cierta edad en que el niño se sociabiliza genera conflictos por una vida social limitada y se puede intentar algún tratamiento.*

El tratamiento psicológico realizado por profesionales con experiencia en este tema, resulta con éxito en un alto porcentaje.

Debe considerarse en la enuresis secundaria cuando está presente algún conflicto familiar u social.

Algunos medicamentos se utilizan si no hay resultado y deben ser indicados por el urólogo y/o nefrólogo infantiles.





Enuresis

- *Sea primaria o secundaria debe consultarse con el pediatra.*
- *La incontinencia indica patología por lo tanto la consulta pediátrica debe realizarse cuando se presenta.*