

Clave de Respuestas correctas. Con porcentaje de acierto

PREG	CLAVE	% de ACIERTO	PREG	CLAVE	% de ACIERTO	PREG	CLAVE	% de ACIERTO	PREG	CLAVE	% de ACIERTO
1	A	99,05%	26	D	97,79%	51	B	94,42%	76	C	88,62%
2	C	96,73%	27	C	97,38%	52	C	97,54%	77	B	83,45%
3	D	98,57%	28	B	80,63%	53	C	92,71%	78	A	96,85%
4	A	99,19%	29	D	50,48%	54	A	99,39%	79	D	97,35%
5	B	98,82%	30	C	94,07%	55	C	97,05%	80	D	93,48%
6	A	97,99%	31	D	98,49%	56	D	98,30%	81	A	73,55%
7	C	98,88%	32	D	95,32%	57	A	98,55%	82	A	96,44%
8	D	97,61%	33	C	97,23%	58	D	95,51%	83	B	98,54%
9	B	96,00%	34	D	98,63%	59	D	97,94%	84	B	97,66%
10	A	98,85%	35	C	98,73%	60	B	94,84%	85	A	90,40%
11	C	99,21%	36	B	95,60%	61	B	91,87%	86	B	98,85%
12	A	79,03%	37	B	80,35%	62	B	97,79%	87	C	97,82%
13	A	98,96%	38	B	98,69%	63	ANULADA		88	B	53,27%
14	D	98,90%	39	D	97,39%	64	B	81,49%	89	A	88,00%
15	B	91,50%	40	C	97,05%	65	C	85,18%	90	C	87,47%
16	C	36,36%	41	A	98,39%	66	D	96,48%	91	B	95,17%
17	C	98,88%	42	D	95,65%	67	C	96,63%	92	A	90,81%
18	C	98,36%	43	D	97,38%	68	D	89,04%	93	B	16,55%
19	A	97,60%	44	B	98,17%	69	D	77,75%	94	A	42,29%
20	C	98,31%	45	C	98,58%	70	C	97,87%	95	D	70,43%
21	A	97,72%	46	C	68,34%	71	B	43,63%	96	D	95,97%
22	C	98,91%	47	A	58,46%	72	A	59,44%	97	A	98,55%
23	D	98,81%	48	D	94,60%	73	C	93,84%	98	D	85,52%
24	C	99,39%	49	C	99,05%	74	C	71,98%	99	B	93,10%
25	B	97,02%	50	C	98,26%	75	D	80,84%	100	B	93,72%

Justificación de respuestas del examen 2009

Pregunta 16: Respuesta correcta c)

Varios tipos de familia pueden generar o presentar Trastornos de Ansiedad en los niños. En el texto se menciona que se realizó un estudio sobre características familiares identificadas como "agregación familiar" y que se encontró una relación directa con los trastornos de ansiedad.

Preguntas 63: ANULADA por razones técnicas.

Pregunta 71: Respuesta correcta b)

La pregunta apunta a una **situación aguda** en un niño mayor de 8 años, con sintomatología de menos de 8 semanas, en la que se puede optar por medicar este episodio, en forma transitoria. En la pregunta se aclara "**en caso de tener que usar una medicación**". No se habla de único tratamiento, siempre va acompañado de psicoterapia. El uso de benzodiacepinas en niños y adolescentes es muy restringido por su efecto paradójico, deterioro cognitivo y mnémico. En trastornos de ansiedad crónicos, por períodos más prolongados, corresponde indicar ISRS.

Pregunta 93: Respuesta correcta b)

La Gammaglobulina sólo es útil dentro de las 48 horas posexposición y no más de las 96 horas. Si la hermana se brotó hace 3 días, contagia desde hace 5 días (más de 96 horas) ya no tiene sentido la Gammaglobulina.

El Accclovir puede ser útil entre los días 7 y 9 posexposición (días 5 a 7 del brote de la hermana). Recordar que es diferente a un contacto ocasional, que el contacto es continuo y debe considerarse desde el inicio del período de contagio.

Anexo vacunas. El niño curado de cáncer. Módulo 4. Pág. 112-114

Pregunta 94: Respuesta correcta a)

Anexo vacunas. El niño curado de cáncer. Módulo 4. Pág. 112-114

En **vacunación de los convivientes**, pág. 114, no se menciona antineumocócica ni antimeningocócica.