

Signos y síntomas sugestivos de estreñimiento funcional

- Inicio del estreñimiento tras un período libre del mismo.
- Antecedente de un factor precipitante
 - Cambios de patrones alimentarios: inicio de lactancia artificial o introducción de la alimentación complementaria.
 - Aprendizaje inadecuado del control de esfínteres.
 - Situaciones emocionales estresantes: cambio de colegio o domicilio, cuadros depresivos, nacimiento de un hermano, pérdida de un ser querido, separación de los padres, abuso sexual, etc.
- Posturas retentivas y temor a la defecación.
- Incontinencia fecal retentiva.
- Ausencia de síntomas y signos de alarma.

Signos y síntomas de alarma (sugestivos de causa orgánica) en relación al estreñimiento

- Emisión del meconio pasadas las 48 horas de vida.
- Inicio del entreñimiento al nacimiento.
- Heces acintadas en menores de un año.
- Vómitos biliosos.
- Alteraciones en la exploración física:
 - Fallo de medro: alteración en el desarrollo pondero-estatural.
 - Distensión abdominal persistente.
 - Alteraciones en columna, espalda y/o región anal.
 - Fosa sacra cubierta de pelo.
 - Agenesia sacra.
 - Ano anterior.
 - Alteraciones neurológicas.
 - Ausencia de reflejo cremastérico.
 - Pérdida de fuerza en extremidades inferiores.
 - Anomalías en el tacto rectal.
 - Ampolla rectal vacía.
 - Masa fecal abdominal con ausencia de heces en el tacto rectal.
 - Salida a borbotones de heces líquidas o aire al retirar el dedo.

Constipación

Una consulta frecuente

¿Qué debe Ud. Saber?



Por un niño sano
en un mundo mejor

Sociedad Argentina de Pediatría
Av. Coronel Díaz 1971/75 (C1425DQF)
CABA - Argentina (54-11) 4821-8612
institucional@sap.org.ar
www.sap.org.ar



Por un niño sano
en un mundo mejor

**Sociedad
Argentina
de Pediatría**

FUNDASAP
FUNDACION SOCIEDAD ARGENTINA DE PEDIATRIA
Construyendo puentes con el niño, su familia y la comunidad