

7° Congreso Argentino
de Pediatría General Ambulatoria



SAP

LA INVESTIGACION EN PEDIATRIA AMBULATORIA

EXPERIENCIAS DE INVESTIGACION

Dra. Valeria Oliva
Dra. María Lía Sartori

Docentes Practica Final Obligatoria UNTI

Mapa de Ruta



Introducción






PASANTÍA PERIURBANA - Salud Familiar y Comunitaria

Unidad de Práctica Final Obligatoria - Facultad de Medicina – Universidad Nacional de Tucumán

LOS NUCLEOS DE ACTIVIDADES



SALUTOGÉNESIS

SALUD FAMILIAR

SALUD COMUNITARIA



NUCLEOS CONCEPTUALES

Objetivos

Compartir experiencia

Ideas fuerza



LEARNING BY DOING



**Desarrollar
una actitud
y habilidades
que impulsen
a aprender,
a aprender haciendo**



“La practica diaria es fuente continua de formación continuada, si la exploramos con sinceridad y con metodología apropiada”


Gervas, Carra Fernandez. La docencia en un centro de salud no docente




Así planeaste tu vida



Así es la realidad...



Introducción



Objetivos



Materiales y métodos

Diseño

*Anticipar problemas, sesgos,
inclusión*

Ética



Mapa de Ruta





UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMAN

FACULTAD DE MEDICINA

PASANTÍA PERIURBANA CAPS N°60 "GUILLERMO DURÁN"-
B° EL MIRADOR - SALTA

**CONOCIMIENTO SOBRE
METODOS
ANTICONCEPTIVOS EN
ALUMNOS DE 6° Y 7° GRADO
DE LA ESCUELA "FRAY
HONORATO PISTOIA"**

Autor: Paz Costa, Nicolas

Tutor: Dra. Sartori, Lia

Periodo Octubre – Diciembre 2017

Conocimientos sobre métodos anticonceptivos en alumnos de 6 y 7° grado Escuela Fray H. Pistoia



UNIVERSIDAD DE TUCUMÁN
FACULTAD DE MEDICINA
INSANTIA PERIURBANA SALTA
CENTRO DE SALUD N° 60



INDICE

INTRODUCCION.....	Pag. 3
MATERIALES Y METODOS.....	Pag. 6
RESULTADOS.....	Pag. 8
CONCLUSION Y DISCUSION.....	Pag. 10
BIBLIOGRAFIA.....	Pag. 12
ANEXO.....	Pag. 14


Conocimientos sobre métodos anticonceptivos en alumnos de 6 y 7° grado Escuela Fray H. Pistoia

- Los objetivos específicos de la investigación fueron:
- Determinar el conocimiento de métodos anticonceptivos de alumnos del 7° año
- Determinar el conocimiento de métodos anticonceptivos de alumnos del 6° año
- Comparar el conocimiento de métodos anticonceptivos entre alumnos de 6° y 7° año

RESULTADOS


Participaron voluntariamente del trabajo 70 alumnos en total, correspondiendo el 67% (47) a los alumnos de 7° grado, con edades entre

Grafico 1: Distribucion por sexo de los alumnos de 6° y 7° grado de la Escuela Fray Honorato Pistoia (N=70)



los 11 y los 15 años, con un promedio general de 12 años.

Grafico N°3: Frecuencia relativa de conocimiento sobre los distintos Metodos Anticonceptivos en alumnos de 7° Grado (n=40)



Sobrepeso y obesidad en alumnos de 1er y 7mo grado de la Escuela Fray Honorato Pistoia

- **Objetivos:**
- Detectar obesidad y sobrepeso en niños de 1er y 7mo grado que concurren a la Escuela Fray Honorato Pistoia
- El propósito de este estudio caracterizar a la población, para así poder realizar intervenciones terapéuticas y seguimiento de los pacientes que lo necesiten, articular interconsultas y realizar acciones de promoción de salud.

Materiales y métodos

Tipo de estudio: se realizó un estudio descriptivo, observacional, de corte transversal


Población: niños de 1er y 7mo grado que concurren a la Escuela Fray Honorato Pistoia en el período de marzo de 2017

Criterios de inclusión: alumnos de 1er y 7mo grado que concurren a la Escuela Fray Honorato Pistoia que presenten autorización firmada por los padres o tutores

Criterios de exclusión: alumnos de 1er y 7mo grado que concurren a la Escuela Fray Honorato Pistoia que no presenten autorización firmada por los padres o tutores

Instrumentos de recolección de datos: se utilizó una planilla estructurada tomada del programa ProSanE donde se registró peso, talla, edad, percentilos correspondientes

Gráfico N° 1: Frecuencia absoluta del estado nutricional de los alumnos de 1er grado que concurren a la escuela Fray Honorato Pistoia



Discusión

Del total de los alumnos evaluados de 7mo grado un poco menos de la mitad, 45%, se encuentran con estado nutricional adecuado, si bien son la mayoría de los niños evaluados, debe tenerse en cuenta que si se suman los alumnos con sobrepeso y obesidad representan un 50%, lo cual nivela la situación. Solamente dos niños presentaron riesgo de bajo peso y bajo peso.



Universidad Nacional de Tucumán
Facultad de Medicina
Pasantía Periurbana Barrio Constitución



**Efectos adversos del uso de Implante
subdérmico percibidos por mujeres en edad
reproductiva de 14 a 24 años atendidas en el
centro de salud N°18 de Barrio Constitución**

Herbert Marcel Schneidewind Gropellier
Instructora: Dra. Lia Sartori – Dra. Valeria Oliva
Febrero - Abril 2018

Objetivos

Determinar la frecuencia y tipo de efectos adversos percibidos por las mujeres entre 14 y 24 años que se colocaron el implante subdérmico en el centro de salud n°18 Barrio Constitución durante el período de Mayo del 2015 a Febrero del 2016.

El propósito de este trabajo es conocer cuales son los efectos adversos más frecuentes percibidos por las mujeres con el fin de asesorar mejor a las pacientes sobre el uso de este método anticonceptivo.

Materiales y Métodos

Tipo de estudio: Se realizó un estudio descriptivo, observacional, de corte transversal.

Población: Se tomaron todas las mujeres entre 14 y 24 años que se colocaron el implante subdérmico en el centro de salud n°18 Barrio Constitución durante el período de Mayo del 2015 a Febrero del 2016.

Criterios de inclusión: Todas las mujeres que cumplen con las condiciones anteriormente mencionadas.

Criterios de exclusión: Se excluyeron a todas aquellas mujeres que no presentaron efectos adversos, que no quisieron participar del estudio o que no se pudo contactar.

Instrumento de recolección de datos: Se utilizó una encuesta estructurada, con preguntas abiertas y cerradas que se basó en una utilizada en un trabajo previo.⁴

Procedimientos: La encuesta se realizó en forma telefónica y los datos se recogieron en una planilla de Excel confeccionada para tal fin.

Procesamiento de datos: Una vez realizadas todas las encuestas, la información fue volcada en cuadros y gráficos para su posterior análisis.

Consideraciones éticas: Se garantizó a las pacientes el anonimato y la confidencialidad de los datos, así como el derecho a no participar del estudio asegurándoles que la atención en el centro de salud no se vería modificada si se negaban a participar.

Resultados y gráficos

La edad promedio fue de 18,2 años con un desvío estándar de 2,06.

Tabla 1: Frecuencia absoluta de cefalea en mujeres entre 14 y 24 años que se colocaron el implante subdérmico en el centro de salud n°18 Barrio Constitución durante el período de Mayo del 2015 a Febrero del 2016.

	SI	NO
Cefalea	4	8

Gráfico 1: Frecuencia relativa de cefalea en mujeres entre 14 y 24 años que se colocaron el implante subdérmico en el centro de salud n°18 Barrio Constitución durante el período de Mayo del 2015 a Febrero del 2016.




Gráfico 5: Frecuencia relativa de aumento de peso en mujeres entre 14 y 24 años que se colocaron el implante subdérmico en el centro de salud n°18 Barrio Constitución durante el período de Mayo del 2015 a Febrero del 2016.





Gráfico 8: Frecuencia relativa de dolor en sitio del implante en mujeres entre 14 y 24 años que se colocaron el implante subdérmico en el centro de salud n°18 Barrio Constitución durante el período de Mayo del 2015 a Febrero del 2016.



Discusión


Sobre un total de 60 personas que se colocaron el implante en el período señalado, solo se pudo realizar la encuesta a 12 teniendo en cuenta criterios de inclusión y exclusión.

En cuanto a los motivos que obstaculizaron la encuesta podemos mencionar la falta o error en los datos en las planillas de control y registro de colocación de implante, por cambio de número telefónico, y por negarse a participar de la encuesta.

Dentro de los efectos adversos, los más frecuentes fueron menstruaciones irregulares en el 92% de las encuestadas, aumento de peso en un 58%, y cefalea con 33%. Durante la encuesta telefónica, 11 mujeres mencionaron amenorrea luego de preguntarles si presentaban menstruaciones irregulares. Solo una refirió presentar metrorragia, que fue por lo que consultó a un profesional en el centro de salud n°18.

SITIO WEB

<http://www.pperiurbana.ecaths.com/>




PROPUESTA FINAL

USAR LA PRACTICA
DIARIA COMO FUENTE
DE PREGUNTAS



EMPEZAR CON UN
ESTUDIO
OBSERVACIONAL



PENSAR EN UN
TIEMPO PROTEGIDO

MUCHAS GRACIAS



CACHI-SALTA-ARGENTINA